ریاضیات گسسته

۱۲

نمونه سوالات نهایی

دی ۹۹

bekhunofficial

باسمه تعالی

سؤالات امتحان نهایی درس : **ریاضیات گسسته**	نام و نام خانوادگی :	ساعت شروع: **۱۰صبح**	رشته : **ریاضی فیزیک**
پایه **دوازدهم** دورهٔ دوم متوسطه	تعداد صفحه: **۲**	تاریخ امتحان : **۱۳۹۹/۱۰/۲۷**	مدت امتحان: **۱۲۰ دقیقه**
دانش آموزان روزانه، بزرگسال و داوطلبان آزاد سراسرکشور در **نوبت دی** ماه سال **۱۳۹۹**		مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی http://aee.medu.ir	

ردیف	سوالات پاسخ نامه دارد	نمره
۱	گزاره‌های درست را مشخص کرده و برای گزاره‌های نادرست، مثال نقض ارائه کنید. الف)برای هر عدد طبیعی n بزرگ‌تر از ۱، عدد $۲^n - ۱$ اول است. ب)برای دو عدد طبیعی a و b ، اگر $a \mid b$ آن‌گاه $[a,b] = \mid b \mid$. پ) معادله هم‌نهشتی $ax \overset{m}{\equiv} b$ دارای جواب است اگر و تنها اگر $(a,b) \mid m$.	۱
۲	اگر α و β دو عدد گنگ باشند ولی $\alpha + \beta$ گویا باشد، با استفاده از برهان خلف ثابت کنید $\alpha - \beta$ گنگ است.	۱/۵
۳	اگر باقی‌مانده تقسیم اعداد a و b بر ۱۷ برابر ۵ و ۳ باشد، در این صورت باقی‌مانده تقسیم عدد $(۲a - ۵b)$ بر ۱۷ را بیابید.	۱
۴	اگر a عددی طبیعی باشد، حاصل $(۵a + ۴,۲a + ۳)$ را به دست آورید.	۱/۲۵
۵	باقی مانده تقسیم $(۱۹ + ۳۸^{۳۶})$ را بر ۴ به دست آورید.	۱/۲۵
۶	معادله هم‌نهشتی $۸x \overset{۱۲}{\equiv} ۲۰$ را حل کرده و جواب عمومی آن را به دست آورید.	۱
۷	جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید. الف) مرتبه گراف نشان دهنده تعداد ..... گراف می‌باشد. ب) اگر یک یال، یک رأس را به خود آن رأس وصل کند، این یال را ..... می‌نامیم. پ) دو یال را ..... می‌نامیم هرگاه رأسی وجود داشته باشد که هر دوی آن‌ها را به هم متصل کند. ت) تعداد رأس‌های فرد هر گراف عددی ..... است.	۱
۸	گراف G به صورت مقابل را در نظر بگیرید. الف) درجه رأس e در گراف مکمل G چند است؟ ب) تمام دورهای موجود در گراف G را بنویسید. پ) $\Delta(G)$ را مشخص کنید. 	۲
۹	الف) گراف k - منتظم را تعریف کنید. ب) گراف $P_۷$ را رسم کنید. پ) آیا گراف‌های C_n منتظم هستند؟	۱
۱۰	در گراف G که شکل آن در مقابل داده شده است: الف)یک مجموعه احاطه‌گر مینیمال با۳ عضو بنویسید. ب) عدد احاطه‌گری G را تعیین کنید. 	۲
۱۱	با ارقام ۴، ۳، ۷، ۸، ۶ چند عدد ۵ رقمی می توان نوشت که: الف) اعداد زوج کنار هم باشند. ب) اعداد فرد کنار هم باشند.	۱

« بقیه سوالات در صفحه دوم»

مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی

باسمه تعالی

سؤالات امتحان نهایی درس : **ریاضیات گسسته**	نام و نام خانوادگی :	ساعت شروع: **۱۰صبح**	رشته : **ریاضی فیزیک**
پایه **دوازدهم** دورهٔ دوم متوسطه	تعداد صفحه: **۲**	تاریخ امتحان : **۱۳۹۹/۱۰/۲۷**	مدت امتحان: **۱۲۰ دقیقه**
دانش آموزان روزانه، بزرگسال و داوطلبان آزاد سراسرکشور در **نوبت دی** ماه سال **۱۳۹۹**			مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی http://aee.medu.ir

ردیف	سوالات پاسخ نامه دارد	نمره
۱۲	معادله $x_1+x_2+x_3+x_4+x_5+x_6=17$ چند جواب صحیح و نامنفی دارد، به شرط آن که $x_5=2$, $x_2>2$ باشند.	۱/۵
۱۳	مربع لاتین A را در نظر بگیرید. $A=\begin{array}{\|c\|c\|c\|}\hline 2&1&3\\\hline 3&2&1\\\hline 1&3&2\\\hline\end{array}$ الف) با اِعمال یک جایگشت روی درآیه های مربع لاتین A ، مربع لاتین B را تولید کنید. ب)متعامد بودن دو مربع لاتین A و B را بررسی کنید.	۲
۱۴	مجموعه $S=\{1,2,...,400\}$ را در نظر بگیرید. چند عدد در S وجود دارند به طوری که نه بر ۵ و نه بر ۷ بخش‌پذیر باشند.	۱/۵
۱۵	حداقل چند نفر در یک سالن همایش حضور داشته باشند تا مطمئن باشیم دست کم ۳ نفر وجود دارند که دو حرف اول و دوم نام خانوادگی آن‌ها مانند هم و غیر تکراری است؟	۱
	" موفق باشید " جمع نمره	۲۰

مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی

باسمه تعالی

راهنمای تصحیح امتحان نهایی درس: **ریاضیات گسسته**	رشته: **ریاضی فیزیک**	ساعت شروع: **۱۰ صبح**	مدّت امتحان: **۱۲۰دقیقه**
پایه **دوازدهم** دورهٔ دوم متوسطه		تاریخ امتحان : **۱۳۹۹/۱۰/۲۷**	
دانش آموزان روزانه، بزرگسال و داوطلبان آزاد سراسرکشور **دی ماه سال ۱۳۹۹**		مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی http://aee.medu.ir	

ردیف	راهنمای تصحیح	نمره
۱	**الف) نادرست** (۰/۲۵) ، $n=4 \Rightarrow 2^4-1=15 \notin P$ (۰/۲۵) (قسمت پ کار در کلاس صفحه ۳) **ب) درست** (۰/۲۵) (قسمت ب سوال ۱ کار در کلاس صفحه ۱۳) **پ) درست** (۰/۲۵) (قضیه صفحه ۲۵)	۱
۲	**فرض خلف:** $\alpha-\beta$ گویاست. (۰/۲۵) (تمرین۳ صفحه۸) $\alpha-\beta=m\in Q$ (۰/۲۵) $\alpha+\beta=n\in Q$ (۰/۲۵) $\Rightarrow 2\alpha=m+n$ (۰/۲۵) $\Rightarrow \alpha=\frac{m+n}{2}$ (۰/۲۵) $\Rightarrow \alpha\in Q$ **تناقض با فرض** (۰/۲۵)	۱/۵
۳	$a=17q+5$ (۰/۲۵) $b=17q'+3$ $\Rightarrow 2a-5b=\underbrace{17\times 2q+10-17\times 5q'-15}_{(۰/۲۵)}=\underbrace{17\overbrace{(2q-5q'-1)}^{k\in Z}+12}_{(۰/۲۵)}=17k+12 \Rightarrow r=12$ (۰/۲۵) (مثال صفحه ۱۴)	۱
۴	$(5a+4,2a+3)=d \Rightarrow \begin{matrix} d\mid 2a+3 & (۰/۲۵) \\ d\mid 5a+4 & (۰/۲۵) \end{matrix} \Rightarrow d\mid -2(5a+4)+5(2a+3)$ (۰/۲۵) $\Rightarrow d\mid 7$ (۰/۲۵) $\Rightarrow d=1$ یا 7 (۰/۲۵) (مشابه تمرین ۶ صفحه ۱۶)	۱/۲۵
۵	$38^{36}+19^{4}\equiv 3$ (۰/۲۵) $\Rightarrow 19^{4}\equiv 3$ (۰/۲۵) , $38^{36}\equiv_4 0$ (۰/۲۵) $\rightarrow 38^{2}\equiv_4 4\equiv_4 0$ (۰/۲۵) $\rightarrow 38\equiv_4 2$ (۰/۲۵) (مشابه سوال۹ صفحه ۲۹)	۱/۲۵
۶	$8x\equiv_{12} 20\equiv_{12} 32$ (۰/۲۵) $\xrightarrow{(8,12)=4\ (۰/۲۵)} x\equiv_{\frac{12}{4}=3} 4$ (۰/۲۵) $\Rightarrow x=3k+4$ (۰/۲۵) (قسمت ب تمرین ۱۴ صفحه ۳۰)	۱
۷	**الف) رئوس** (۰/۲۵) (تعریف مرتبه صفحه ۳۵) **ب) طوقه** (۰/۲۵) (تعریف طوقه صفحه ۳۶) **پ) مجاور** (۰/۲۵) (تعریف دو یال مجاور صفحه ۳۶) **ت) زوج** (۰/۲۵) (نتیجه قضیه صفحه ۴۰)	۱
۸	**الف) ۳** (۰/۲۵) (مسئله ۱ صفحه ۳۸) **ب)** b,d,c,b (۰/۵) ، a,b,c,a (۰/۵) ، a,b,d,c,a (۰/۵) (تعریف دور صفحه ۳۸) **توجه:** در قسمت (ب) ممکن است دانش آموز شروع دور را با رأس دیگری آغاز کرده باشد. مثلا دور b,d,c,b را به فرم d,b,c,d نوشته باشد. به این دورها نیز نمره داده شود. **پ) ۴** (۰/۲۵) (مفهوم ماکزیمم درجه صفحه ۳۷)	۲
۹	**الف) گرافی که درجه تمام رئوس آن با هم مساوی و برابر با عدد k باشد.** (۰/۵) (تعریف گراف منتظم صفحه ۳۵) **ب)** ●—●—●—●—●—●—● (۰/۲۵) (تعریف P_n صفحه ۳۸) **پ) بله** (۰/۲۵) (مفهوم گراف منتظم صفحه ۳۵)	۱

ادامه پاسخ‌ها در صفحه دوم

باسمه تعالی

راهنمای تصحیح امتحان نهایی درس: **ریاضیات گسسته**	رشته: **ریاضی فیزیک**	ساعت شروع: **۱۰ صبح**	مدّت امتحان: **۱۲۰دقیقه**
پایه **دوازدهم** دورهٔ دوم متوسطه		تاریخ امتحان : **۱۳۹۹/۱۰/۲۷**	
دانش آموزان روزانه، بزرگسال و داوطلبان آزاد سراسرکشور **دی ماه سال ۱۳۹۹**		مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی http://aee.medu.ir	

ردیف	راهنمای تصحیح	نمره
۱۰	الف) $\{1,6,4\}$ یا $\{1,5,7\}$ (۰/۷۵) (مشابه تمرین ۱۱صفحه ۵۴) ب) $۲=\left\lfloor \frac{۷}{۴+۱} \right\rfloor$ (۰/۲۵) بنابراین $\gamma(G)\geq ۲$ (۰/۲۵) (*). از سوی دیگر $\{2,5\}$یک مجموعه احاطه‌گر است (۰/۲۵) لذا $\gamma(G)\leq ۲$ (۰/۲۵) (**). از (*) و (**) نتیجه می‌شود که $\gamma(G)=۲$. (۰/۲۵) (مشابه تمرین ۳ صفحه ۵۲)	۲
۱۱	الف) $۳!\times ۳!$ (۰/۵) ب) $۲!\times ۴!$ (۰/۵) (مشابه مثال صفحه ۵۶)	۱
۱۲	$y_۲=x_۲-۳\ ,\ y_۲\geq ۰$ (۰/۲۵) , $x_۵=۲$ $x_۱+\underbrace{y_۲+۳}_{(۰/۲۵)}+x_۳+x_۴+۲+x_۶=۱۷$ (۰/۲۵) $\Rightarrow x_۱+y_۲+x_۳+x_۴+x_۶=۱۲$ (۰/۲۵) $\Rightarrow$ تعداد جواب ها $=\binom{۱۶}{۴}$ (۰/۵) (مشابه تمرین ۵ کار در کلاس صفحه ۶۱)	۱/۵
۱۳	الف) $B=\begin{array}{|c|c|c|}\hline ۱ & ۳ & ۲ \\ \hline ۲ & ۱ & ۳ \\ \hline ۳ & ۲ & ۱ \\ \hline\end{array}$ (۰/۷۵) $\begin{array}{l}۱\to ۳\\ ۲\to ۱\\ ۳\to ۲\end{array}$ ب) $\begin{array}{|c|c|c|}\hline ۳۲ & ۱۳ & ۲۱ \\ \hline ۱۳ & ۲۱ & ۳۲ \\ \hline ۲۱ & ۳۲ & ۱۳ \\ \hline\end{array}$ (۰/۷۵) متعامد نیستند. زیرا در مربع آخر، عدد دو رقمی تکراری داریم. (۰/۵) (مشابه کار در کلاس صفحه ۶۴ و مفهوم متعامد بودن صفحه ۶۵)	۲
۱۴	$A=\{n\in S \mid n=۵k\ ,\ k\in Z\}\Rightarrow n(A)=\left\lfloor \frac{۴۰۰}{۵} \right\rfloor=۸۰$ (۰/۲۵) $B=\{n\in S \mid n=۷k\ ,\ k\in Z\}\Rightarrow n(B)=\left\lfloor \frac{۴۰۰}{۷} \right\rfloor=۵۷$ (۰/۲۵) $A\cap B=\{n\in S \mid n=۳۵k\ ,\ k\in Z\}\Rightarrow n(A\cap B)=\left\lfloor \frac{۴۰۰}{۳۵} \right\rfloor=۱۱$ (۰/۲۵) $\underbrace{\lvert\overline{A\cup B}\rvert=\lvert S\rvert-\lvert A\cup B\rvert}_{(۰/۲۵)}=\underbrace{۴۰۰-(۸۰+۵۷-۱۱)}_{(۰/۲۵)}=۲۷۴$ (۰/۲۵) (مشابه فعالیت صفحه ۷۵)	۱/۵
۱۵	$k+۱=۳\Rightarrow k=۲$ (۰/۲۵) , $n=۳۲\times ۳۱=۹۹۲$ (۰/۲۵) = تعدا لانه ها تعداد کبوترها $=۲\times ۹۹۲+۱=۱۹۸۵$ (۰/۵) (سوال ۳ کار در کلاس صفحه ۸۲)	۱
	جمع نمره	۲۰

«همکاران گرامی لطفا برای راه حل های صحیح دیگر بارم را به تناسب تقسیم فرمایید.»

سایت بخـــون
همیشه رایگان

- گام به گام
- فیلم آموزشی
- نمونه سوال
- مشاوره
- جزوه
- برنامه‌ریزی

کلیک کنید

www.bekhun.com